

WAARSCHUWINGSKAART VOOR DE PATIËNT

UPLIZNA (inebilizumab)

Naam patiënt:

Ontvangt inebilizumab voor NMOSD.

INEBILIZUMAB KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE BIJWERKINGEN. Let op tekenen en symptomen om infecties vroegtijdig te ontdekken:

- Ernstige infectie
- Reactivatie van virussen
- Opportunistische infectie
- Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML)

INEBILIZUMAB is een medicijn voor volwassenen voor de behandeling van anti-aquaporine-4 (AQP4) antilichaam-positieve neuromyelitis optica spectrumstoornissen (NMOSD). NMOSD is een zeldzame auto-immuunziekte. Het afweersysteem (immuunsysteem) van de patiënt werkt hierbij niet goed en valt de eigen zenuwen in de ogen, hersenen of rug aan. Dit kan leiden tot een ontsteking van de zenuwen. De patiënt kan hierdoor (tijdelijk) blind of verlamd kan raken. Inebilizumab zorgt ervoor dat de ontsteking van de zenuwen minder wordt.

BELANGRIJKE MOGELIJKE BIJWERKINGEN INEBILIZUMAB

Het risico op infectie is verhoogd.
Ernstige of ongebruikelijke infecties
kunnen optreden.

Vertel het uw arts als u symptomen van een infectie ervaart, zoals:

- Koorts of koude rillingen, kortademigheid, hoesten, vermoeider voelen dan normaal - dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking
- Rode, warme, pijnlijke en/of gespannen huid - dit kan een teken zijn van een ernstige bacteriële huidinfectie (cellulitis)

- Pijnlijke huiduitslag met blaren - dit kan een teken zijn van gordelroos (herpes zoster)
- Een branderig gevoel bij het plassen of vaker moeten plassen dan normaal - dit kan een teken zijn van een blaasontsteking

Virusinfecties die u in het verleden had, kunnen worden gereactiveerd. Dit kan gebeuren als het immuunsysteem verzwakt is. Een voorbeeld van een ernstige infectie is hepatitis, een leverinfectie. Waarvan symptomen zijn: (koorts, buikpijn, vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, en in sommige gevallen geelzucht (vergeling van de huid en ogen). Voor elke behandeling wordt een hepatitis-test uitgevoerd. Vertel uw arts onmiddellijk over eventuele symptomen van infectie.

Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie (PML) is een zeldzame infectie van de hersenen. PML kan leiden tot de dood of ernstige invaliditeit. Het kan beginnen met milde symptomen. Het kan echter binnen enkele dagen of weken verergeren.

Symptomen van PML zijn:

- Zwakte aan één kant van het lichaam
- Ongecontroleerde onhandige bewegingen en moeite met de balans
- Veranderingen in het zicht in de ogen
- Veranderingen in denken, geheugen, en oriëntatie

- Veranderingen in persoonlijkheid
Verwardheid

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze symptomen heeft

Draag deze kaart altijd bij u.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code/bezoek de link: tinyurl.com/sj8m75te voor het online materiaal.



Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts als u symptomen van infectie of PML ervaart:

Naam van behandelend arts

Telefoonnummer

Behandelend ziekenhuis