

CHECKLIST VOOR ZELFTOEDIENING

VAN NPLATE® (ROMIPLOSTIM)

Bevestig dat uw patiënt...

een volwassen patiënt is

belangstelling heeft en in aanmerking komt voor thuistoediening

een vaste dosis van romiplostim gebruikt

- Voor zelftoediening houdt een vaste dosis romiplostim in dat de dosis romiplostim van de patiënt gedurende ten minste 4 weken niet hoefde te worden aangepast. Patiënten die dosisaanpassingen nodig hebben, kunnen niet overstappen op zelftoediening totdat hun dosis is gestabiliseerd – dat wil zeggen totdat hun dosis romiplostim gedurende ten minste 4 weken niet hoefde te worden aangepast

bereid is een trainingsperiode te volgen

- Informeer patiënten dat voor thuistoediening een trainingsperiode moet worden gevolgd en dat ze moeten aantonen dat ze de injectie kunnen gereedmaken en aan zichzelf kunnen toedienen



Zorg ervoor dat patiënten naar huis gaan met...

de juiste dosis genoteerd en afgebeeld in hun *Dagboek voor zelftoediening*. Eventuele vorige doses dienen te worden doorgehaald.

hun reconstitutie(s) romiplostim

(controleer of ze niet per ongeluk de demonstratieset met placebo hebben meegenomen)

alle patiëntmaterialen in hun *Trainingspakket voor thuistoediening*

- Beknopte leidraad
- Onderlegger
- Stappengids
- Dagboek

contactinformatie van een zorgverlener (moet worden genoteerd op de achterzijde van hun *Dagboek voor zelftoediening*, onder de rubriek "Voor het geval u ondersteuning nodig heeft...")

een datum voor een consult om terug te komen na de eerste 4 weken van zelftoediening. Tijdens dit consult dient het trombocytenaantal van de patiënt te worden gecontroleerd en dient de patient weer eenmalig onder toezicht romiplostim te reconstitueren en zelf toe te dienen. Alleen patiënten die aantonen dat ze romiplostim kunnen reconstitueren en zelf kunnen toedienen, mogen doorgaan met zelftoediening.



