

Deze herinneringskaart voor patiënten bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens uw behandeling met denosumab (XGEVA) injecties voor kankergerelateerde aandoeningen.

Uw arts heeft u denosumab injecties (XGEVA) voorgeschreven, die u krijgt om ernstige botcomplicaties (bijv. botbreuken), veroorzaakt door botmetastasen of botkanker, te voorkomen.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een bijwerking die vaak voorkomt (bij maximaal 1 op de 10 patiënten) die denosumab (XGEVA) injecties krijgen. Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden na het stoppen van de behandeling.

Het is belangrijk om het ontwikkelen van botbeschadiging in de kaak zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het een mogelijk pijnlijke aandoening is die moeilijk te behandelen kan zijn. Om het risico op botbeschadiging in de kaak te verminderen kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

Vóórdat u de behandeling krijgt:

- Vraag uw arts of hij/zij een tandheerkundig onderzoek aanraadt voordat u start met de behandeling met denosumab (XGEVA).
- Vertel uw arts (of verpleegkundige/zorgverlener) of u problemen heeft met uw mond of gebit.

Patiënten die tandheerkundige ingrepen ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), die niet regelmatig op controle gaan bij de tandarts, die tandvleesaandoeningen hebben, die roken, of die verschillende soorten kankerbehandelingen krijgen, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van botbeschadiging in de kaak.

Tijdens de behandeling:

- Dient u ervoor te zorgen dat u een goede mondhygiëne heeft en regelmatig voor controle naar de tandarts gaat. Als u een kunstgebit draagt moet u ervoor zorgen dat dit goed past.
- Als u een tandheerkundige behandeling of een tandheerkundige operatie moet ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), informeer dan uw arts en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met denosumab (XGEVA).
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, niet-genezende zweren of pusafscheiding, omdat dit tekenen kunnen zijn van botbeschadiging in de kaak.

Leest u alstublieft voor nadere informatie de bijsluiter van XGEVA.